

UR

URINÁRIO

PARTICIPA NA REDUÇÃO DAS MICÇÕES URINÁRIAS RECORRENTES E DOLOROSAS, IMPONDO UM TERRENO ADVERSO AOS MICRORGANISMOS PATOGENICOS.



INGREDIENTES

	TDR (3 cápsulas)	% VRN*
Extrato seco de Arando vermelho (<i>Vaccinium macrocarpon</i> L. – Frutos, padronizado a 4% de Proantocinidinas)	516 mg	**
Extrato seco de Toranja (<i>Citrus paradisi</i> Macfad – Sementes)	300 mg	**
Extrato seco de Hibisco (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L. – Flor)	270 mg	**
Extrato seco de Urze (<i>Erica cinerea</i> L. – Partes aéreas)	240 mg	**
Extrato seco de Hidraste (<i>Hydrastis canadensis</i> - Raiz, padronizado a 5% de Berberina)	210 mg	**
Bio Catalysador Enzymático® (α-amilase, protéase, Beta D galactosidase, lipase)	168,96 mg	**

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011.

**VRN não estabelecido.

Ingredientes: Extrato seco de Arando vermelho (*Vaccinium macrocarpon* L. - Frutos), Extrato seco de Toranja (*Citrus paradisi* Macfad - Sementes), Extrato seco de Hibisco (*Hibiscus sabdariffa* L. - Flor), Extrato seco de Urze (*Erica cinerea* L. – Partes Aéreas), Extrato seco de Hidraste (*Hydrastis canadensis* - Raiz), Bio Catalysador Enzymático®, Celulose microcristalina, Sais de magnésio de ácidos gordos, Dióxido de Silício (antiaglomerantes);
Cápsula vegetal: Hipromelose, Carbonato de cálcio, Carragenina e Cloreto de Potássio (corantes).

Toma diária recomendada (TDR): 1 cápsula, 3 vezes por dia, antes das refeições (ou conforme prescrição do profissional de saúde). Engolir a cápsula sem abrir nem mastigar, com um copo de água.

Características:

Segundo a sua localização, existem três tipos de infecções urinárias:

- A **Cistite**: inflamação das paredes da bexiga. Esta patologia é quase exclusiva do sexo feminino. A maioria das vezes, a inflamação é provocada pela proliferação de bactérias intestinais do tipo *Escherichia coli*.
A Cistite é geralmente acompanhada por uma uretrite ou inflamação da uretra.
- A **Uretrite**: inflamação normalmente despoletada por uma infecção sexualmente transmissível, ou consequente a uma cistite. A incidência nos dois sexos é diferente e a mulher está mais atreita a esta patologia. Diversos agentes infecciosos podem induzir uma uretrite, sendo o mais vulgar o gonococcus que é responsável pela gonorreia, mas também a clamídea e outros agentes sexualmente transmissíveis podem desencadear uma uretrite.
- A **Pielonefrite**: inflamação do bacinete e do rim. Resulta geralmente de uma infecção bacteriana.
A Pielonefrite aguda é mais vulgar no sexo feminino,

especialmente na grávida. Pode ser uma complicação de uma cistite não tratada ou mal resolvida, resultando numa transposição ou proliferação do agente infeccioso, da bexiga até aos rins.

- As **proantocianidinas do Arando vermelho (*Vaccinium macrocarpon*)** contribuem para diminuir a fixação de bactérias *Escherichia coli* nas paredes das vias urinárias. Previnem algumas infecções urinárias ao acidificarem a urina.
- Os **flavonoides do fruto da Toranja (*Citrus paradisi*)**, devido à capacidade antibiótica de largo espectro, criam uma camada nociva aos microrganismos. Os microrganismos mutagénicos não apresentam qualquer tipo de resistência a estas substâncias antibióticas naturais. Um antibiótico de síntese é dirigido a um espectro bem definido, enquanto, que o extrato de toranja apresenta atividade sobre os diversos tipos de infecções, seja qual for o agente infeccioso responsável.

- Os **polifenóis, especialmente a gossipetina do Hibisco (*Hibiscus sabdariffa*)** colaboram nos processos biológicos que limitam a migração de microrganismos patogénicos. Protegem das infeções urinárias e previnem a formação de cálculos renais. A gossipetina (flavonoide) impede a aderência de microrganismos, como a *Escherichia coli*, o *Staphylococcus aureus*, a *Pseudomonas aeruginosa*, o *Bacillus s.* e o *Bacillus p.*, com a mesma eficácia que o Cloranfenicol, antibiótico de largo espectro.
- Os **flavonoides e taninos da Urze (*Erica cinerea*)** são excelentes diuréticos especialmente nas inflamações urinárias. A sua ação favorece a micção, eliminando desta forma as toxinas. Protegem as paredes das vias urinárias. A sua ação anti-inflamatória, está especificamente orientada para as paredes da bexiga e para a próstata.
- A **berberina da Hidraste (*Hydrastis canadensis*)** é um alcaloide da classe das isoquinolainas que desenvolve as funções metabólicas que geram um terreno prejudicial à adesão dos microrganismos patogénicos, especialmente a *Candida albicans* que normalmente surge após um tratamento com antibióticos. Devido à sua reconhecida ação antifúngica, inibe a adesão de diversos microrganismos patogénicos, como bactérias, protozoários e fungos, responsáveis por numerosas infeções em humanos, tais como, as causadas por *Staphylococcus*, *Escherichia coli*, *Chlamydia trachomatis*, *Salmonella*, *Pneumococcus*, *Pseudomonas*, etc.
- **Recomendações:** Não deve ser excedida a toma diária recomendada. Não se aconselha a toma deste produto durante a gravidez ou amamentação. Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação. Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem de um modo de vida saudável. O produto deve ser guardado fora do alcance e da vista das crianças. Conservar na embalagem original, em local fresco e seco, e ao abrigo da luz.