

TROPHICARD® KÖHLER NE

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Apresentação

Embalagem de 100 comprimidos



Ingredientes: Citrato de potássio, Citrato de magnésio; Amido de milho, Polivinilpolipirrolidona, Celulose (agentes de volume), Talco, Sais de magnésio de ácidos gordos (antiaglomerantes), hidroxipropilmetilcelulose (agente de revestimento).

INGREDIENTES	TDR (3 comp.)	%VRN*	TDR (4 comp.)	%VRN*
Citrato de Potássio	833,30 mg		1111,10 mg	
Potássio	300 mg	15 %	400 mg	20 %
Citrato de Magnésio	750 mg		1000 mg	
Magnésio	90 mg	24 %	120 mg	32 %

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011..

Indicações

Profilaxia ou terapêutica complementar de:

- Enfarte do miocárdio;
- Angina de peito;
- Estenose coronária;
- Arritmias;
- Insuficiências cardíacas.

Toma diária recomendada (TDR)

3 a 4 comprimidos por dia, com um copo de água.

Características

Tropicard® NE é um suplemento alimentar composto por Potássio e Magnésio, adequado à profilaxia dos problemas cardiovasculares. Metade do Magnésio que se encontra no nosso organismo está no coração e nos músculos, onde desempenha um papel muito importante. Para além disso está presente em numerosas reações químicas e enzimáticas que ocorrem diariamente no corpo humano.

O Potássio é muito importante para as nossas células, pois é parte integrante da bomba de Sódio/Potássio.

Estas duas substâncias têm uma estreita relação. Se uma célula perder Potássio, também perde Magnésio, isto é, uma deficiência em Potássio implica uma deficiência em Magnésio, e o transporte ativo do Potássio para dentro da célula através da bomba Sódio/Potássio, apenas acontece quando se encontra presente o Magnésio. O desequilíbrio neste mecanismo influencia a contração muscular do miocárdio afetando o sistema cardiovascular.

Contra-indicações

Hipermagnesemia.

Hiperpotassémia.

Insuficiência renal grave.

Bloqueio auriculoventricular de grau III.

Recomendações

Não deve ser excedida a toma diária indicada.

Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.

Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida saudável.

Conservar na embalagem original protegida da luz, em local seco e a temperatura inferior a 25°C.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

O uso seguro durante a gravidez e amamentação deve ser realizado sob supervisão médica.