

NOTAKEHL® D3 Pomada

AIM n.º 0617508

Apresentação

Tubo de 30 g.

Composição/1g de pomada

100 mg de *Penicillium chrysogenum* e *volumine cellulae* (lyophil., steril.) D3
Excipiente(s): 0,38 g de Lanolina (lanolina alcohols oitment),
0,23 g de propylene glycol, 0,13 g de água, 0,10 g de
Coconuroil fract., 0,03 g de Glyceryl monostearate
40 - 55, 0,02 g de magnesium sulphate a Heptahydrate,
0,01 g de lactic acid.

Características

Notakehl® é obtido do fungo *Penicillium chrysogenum*, de onde também é extraída a Penicilina. Em virtude de ser uma preparação homeopática não apresenta os possíveis efeitos secundários de um tratamento com antibiótico, como: Rash cutâneo, Febre, Broncospasmo, Vasculite, Dermatite esfoliativa, Síndrome de Stevens-Johnson, Destruição da flora intestinal, Anafilaxia. Desta forma, podemos evitar e contornar o problema da multirresistência bacteriana à antibioterapia. Notakehl® actua especificamente em todas as infecções dérmicas causadas por Streptococcus e Staphilococcus.

Indicações

Para supurações bacterianas gerais, problemas ao nível das articulações; epicondilite, espondilopatias, neurites, dor ciática, acne e herpes zooster.

Posologia e modo de administração

Salvo indicação médica em contrário:

Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:

Aplicar uma fina camada na área afetada 1 a 3 vezes por dia.

Contraindicações

No caso de hipersensibilidade à *Penicillium chrysogenum* e, como precaução, esta preparação não deve ser administrada

Reações adversas

Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Notakehl®, pode ocorrer hipersensibilidade, neste caso descontinuar o tratamento, e tratar as reações sintomaticamente.

Efeitos secundários

Não são conhecidos.

Fertilidade, gravidez e lactação

Não há experiência de utilização deste medicamento homeopático durante a gravidez ou a lactação, pelo que não deve ser utilizado durante estes períodos, salvo indicação médica prévia.

Precauções

Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.

Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.

Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25°C.

O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Duração do tratamento

Depende do conselho do terapeuta.

Aviso

Uso externo.

