

SANKOMBI® D5 Gotas

AIM n.º 0136003

Apresentação

Frasco conta-gotas de 10 ml

Composição/1 ml

0,5 ml de *Mucor racemosus* e *volumine cellulae* (Lyophil., steril.) D5

0,5 ml de *Aspergillus niger* e *volumine cellulae* (Lyophil., steril.) D5

Excipiente(s): Água purificada.



Características

No sangue e tecidos dos seres humanos e animais, vivem micróbios que são normalmente inofensivos e que mantêm diversos mecanismos reguladores. Segundo o Prof. Enderlein, estes "endobiontes" são geralmente fases não-patogênicas dos fungos, *Mucor racemosus* Fresen e *Aspergillus niger* van Tieghem. Como todos os microorganismos, estes estão sujeitos à lei de ciclogenia, o que significa que o seu desenvolvimento passa pelas seguintes fases: fase primitiva - bactéria - fungo, através da qual a virulência e patogenicidade do endobionte aumenta com o desenvolvimento das fases. Se um organismo é acometido de valências superiores torna-se débil, mas com fases de menor valência ainda presentes, este ainda é capaz de degradar as formas patogênicas em estádios primitivos inativos, podendo estas serem eliminadas através das vias de excreção. Sankombi D5 é uma combinação dessas duas espécies de fungos, o *Mucor racemosus* e *Aspergillus niger*.

O efeito de Sankombi D5 sobre as células T que produzem Neopterin ficou comprovado em testes clínicos feitos em crianças suscetíveis a infecção.

A Neopterin é uma substância que aumenta a resposta imunitária através da ativação dos macrófagos. A terapia com Sankombi D5 melhora tanto as queixas físicas como os parâmetros clínicos e sorológicos. Com o auxílio dessa terapia biológica, não só as mucosas e a flora bacteriana natural são reguladas, como é ainda ativado o transporte de produtos de excreção através do sistema linfático e sanguíneo.

Indicações

Para Adenoidites, edema dos gânglios linfáticos, angina de Vincent, amigdalite, é um medicamento adequado para o restabelecimento da simbiose, quando há uma suscetibilidade para infecções e alergias ao nível pediátrico.

Posologia e Modo de Administração

Salvo indicação médica em contrário:

• **Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:**

Via Oral: 5 a 10 gotas, uma vez ao dia.

Contraindicações

No caso de hipersensibilidade ao *Mucor racemosus* e *Aspergillus niger*, e como precaução, esta preparação não deve ser administrada.

Reações adversas

Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Sankombi, pode ocorrer hipersensibilidade, neste caso deve descontinuar o tratamento, e tratar as reações sintomaticamente.

Interações medicamentosas

Não são conhecidas.

Efeitos secundários

Não são conhecidos.

Fertilidade, gravidez e lactação

Não há experiência de utilização deste medicamento homeopático durante a gravidez ou a lactação, pelo que não deve ser utilizado durante estes períodos, salvo indicação médica prévia.

Precauções

Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.

Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.

Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25°C.

O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Duração do tratamento

Depende do conselho do terapeuta.